



MacroMix

PARRILLERO INICIADOR

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL CON ADITIVO COCCIDIOSTÁTICO

MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN INTERVENIR

Vitamina A (Retinol, Acetato de), D₃ (Colecalciferol estabilizado), E (Alfa-Tocoferol Absorbato), B₂ (Riboflavina), B₁₂ (Cianocobalamina), Ac. Nicotínico; Ac. Pantoténico (Pantotenato de calcio); Biotina (D-Biotina), K₃ (Menadiona, bisulfito de); Colina (Cloruro de), Cobre (Óxido o Sulfato de), Hierro (Sulfato de), Iodo (Iodato de Calcio), Manganese (Óxido de), Selenio (Selenito de Sodio), Zinc (Óxido de), Carbonato de Calcio, Fosfato bicálcico, Sal. Lisina, Metionina y Treonina. Aditivos enzimas probiótico y secuestrante de toxinas de uso permitido. Maduramicina y Nicarbazina.

INDICACIONES DE USO

El producto está destinado a pollos parrilleros en crianza, desde el día 11° día hasta el 20° de vida del animal. El producto permite conformar un alimento balanceado, mezclándolo con las cantidades especificadas en la tabla de dosificación.

Para la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria, ocular y cutánea (mascarilla, gafas de seguridad y guantes).

Las bolsas vacías no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal o del medio ambiente.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El producto debe mantenerse en lugares secos, frescos y oscuros. En iguales condiciones debe transportarse. Una vez abierta la bolsa, volver a cerrar cuidadosamente evacuando tanto aire como sea posible.

DOSIFICACIÓN

Mezclar 35 kg de este producto con alguna de las siguientes combinaciones:

- Maíz	kg	580	585	590
- Soja, poroto de, desactivado	kg	150	195	200
- Soja, expeller de (42%)	kg	235	----	----
- Soja, harina de extracción (42%)	kg	----	185	----
- Soja, harina HiPro (47%)	kg	----	----	175
- CIVET MACRO-MIX PARRILLERO INICIADOR	kg	35	35	35

para obtener una (1) tonelada de alimento balanceado.

Otras combinaciones de materias primas son posible previa consulta con un profesional nutricionista médico veterinario.

RESTRICCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y

ADVERTENCIAS

- El producto contiene maduramicina y nicarbazina.
- No asociar con tiamulina.
- No modificar la dosis y ante un eventual brote de coccidiosis consultar al médico veterinario.
- En pollas de crianza suministrar hasta el traspaso a jaulas o hasta la 16ª semana de vida. No utilizar en gallinas ponedoras en producción.
- En pollos parrilleros suprimir la medicación 9 días antes de la faena.
- Evitar el contacto con la piel u ojos o su inhalación; en caso de producirse, lavar con abundante agua. No comer ni fumar durante la manipulación del producto o su aplicación. Usar ropas

COMPOSICIÓN

Vitamina A	228.571 UI/kg	Antioxidante	4 mg/kg
Vitamina D ₃	57.143 UI/kg	Biotina	4 mg/kg
Vitamina E	714 UI/kg	Vitamina B ₁₂	1 microg/kg
Manganese	1.886 mg/kg	Metionina	74,0 g/kg
Hierro	1.714 mg/kg	Lisina	37,4 g/kg
Zinc	1.429 mg/kg	Treonina	11.100 mg/kg
Ácido nicotínico	1.143 mg/kg	Calcio (mín.-máx.)	23 - 24 %
Ácido pantoténico	286 mg/kg	Fósforo (mín.-máx.)	8-9 %
Cobre	179 mg/kg	Sal	85,71 g/kg
Vitamina B ₂	171 mg/kg	Probióticos (enzimas y bacterias)	2,86 g/kg
Vitamina K ₃	57 mg/kg	Secuestrante de toxinas	57,14 g/kg
Iodo	23 mg/kg	Maduramicina	0,107 g/kg
Colina	5 g/kg	Nicarbazina	1,143 g/kg
Selenio	4 mg/kg	Excipiente c.s.p.	1,00 kg

USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160

F. ELAB.

F. VTO.

N° LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310/A
Producto Certificado SENASA N° 12-095/A

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 - Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 35 kg