



MacroMix

PARRILLERO TERMINADOR

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL CON ADITIVO COCCIDIOSTATICO

MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN INTERVENIR

Vitamina A (Retinol, Acetato de), D₃ (Colecalciferol estabilizado), E (Alfa-Tocoferol Absorbato), B₂ (Riboflavina), B₁₂ (Cianocobalamina), Ac. Nicotínico; Ac. Pantoténico (Pantotenato de calcio); Biotina (D-Biotina), K₃ (Menadiona, bisulfito de); Colina (Cloruro de), Cobre (Óxido o Sulfato de), Hierro (Sulfato de), Iodo (Iodato de Calcio), Manganese (Óxido de), Selenio (Selenito de Sodio), Zinc (Óxido de), Carbonato de Calcio, Fosfato bicálcico, Sal. Lisina, Metionina y Treonina.
Aditivos: enzimas, probiótico y secuestrante de toxinas de uso permitido. Maduramicina.

INDICACIONES DE USO

El producto está destinado a pollos parrilleros en crianza, desde el 21º día hasta el 40º día de vida del animal. El producto permite conformar un alimento balanceado, mezclándolo con las cantidades especificadas en la tabla de dosificación.
Para la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria, ocular y cutánea (mascarilla, gafas de seguridad y guantes). Las bolsas vacías no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal o del medio ambiente.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El producto debe mantenerse en lugares secos, frescos y oscuros. En iguales condiciones debe transportarse. Una vez abierta la bolsa, volver a cerrar cuidadosamente evacuando tanto aire como sea posible.

DOSIFICACIÓN

Mezclar 35 kg de este producto con alguna de las siguientes combinaciones:

- Maíz	kg	635	630	645
- Soja, poroto de, desactivado	kg	180	220	210
- Soja, expeller de (42%)	kg	150	----	----
- Soja, harina de extracción (42%)	kg	----	115	----
- Soja, harina HiPro (47%)	kg	----	----	110
- CIVET MACRO-MIX PARRILLEROTERMINADOR	kg	35	35	35

para obtener una (1) tonelada de alimento balanceado.

Otras combinaciones de materias primas son posible previa consulta con un profesional nutricionista médico veterinario.

RESTRICCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y

ADVERTENCIAS

El producto contiene Maduramicina.

- No tiene período de retiro previo a la faena de los pollos.

- No suministrar a gallinas ponedoras en producción.

Consumir dentro de los 7 días de preparada la mezcla.

- Evitar el contacto con la piel u ojos o su inhalación; en caso de producirse, lavar con abundante agua. No comer ni fumar durante la manipulación del producto o su aplicación. Usar ropas adecuadas, guantes, protección ocular y respiratoria. Destruir los envases vacíos.

COMPOSICIÓN

Vitamina A	228.571 UI/kg	Selenio	4 mg/kg
Vitamina D ₃	57.143 UI/kg	Antioxidante	4 mg/kg
Vitamina E	714 UI/kg	Biotina	4 mg/kg
Manganese	1.886 mg/kg	Vitamina B ₁₂	1 microg/kg
Hierro	1.714 mg/kg	Metionina	62,9 g/kg
Zinc	1.429 mg/kg	Lisina	49,7 g/kg
Ácido nicotínico	1.143 mg/kg	Treonina	1.400 mg/kg
Ácido pantoténico	286 mg/kg	Calcio (mín.-máx.)	23 - 24 %
Cobre	179 mg/kg	Fósforo (mín.-máx.)	8,0-8,5 %
Vitamina B ₂	171 mg/kg	Sal	85,71 g/kg
Vitamina K ₃	57 mg/kg	Probióticos y enzimas	2,86 g/kg
Iodo	23 mg/kg	Secuestox Plus	57,14 g/kg
Colina	5 g/kg	Maduramicina	0,14285 g/Kg

USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160

F. ELAB.

F. VTO.

Nº LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310/A
Producto Certificado SENASA Nº 12-032/A

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 - Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 35 kg