



Feed

STARTER **EX** EXTRUSADO

SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA TERNEROS DE CRÍA - TERNEROS DE LECHE

MENOR DEPENDENCIA DE LA DIETA LÁCTEA • MENOR COSTO DE CRIANZA • MEJOR ESTADO SANITARIO
MAYOR CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A FORRAJES • MENOR TIEMPO REQUERIDO PARA EL CUIDADO DEL TERNERO

MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN INTERVENIR

Maíz, soja, trigo, cebada, centeno, mijo, sorgo. Expeller de soja; germen de maíz; gluten feed y gluten meal; afrechillo, harinilla, semita y semitín de trigo. Suero. Levadura de cerveza inactivada. Lisina, metionina, treonina. Vitaminas: A, D₃, E, B₁, B₂, B₆, B₁₂, biotina, ácido fólico, K₃, ácido nicotínico, ácido pantoténico, colina. Minerales: carbonato de calcio y/o fosfato bicálcico (Calcio); carbonato de cobalto (Cobalto); óxido de cobre y/o sulfato de cobre (Cobre); fosfato bicálcico (Fósforo); sulfato de hierro (Hierro); iodato de calcio y/o ioduro de potasio (Iodo); óxido de manganeso y/o sulfato de manganeso (Manganeso); selenito de sodio (Selenio); óxido de zinc y/o sulfato de zinc (Zinc). Antifúngico (Propionato de calcio), antioxidante (Etoxiquina), aromatizante y saborizante (Vainillina y Etil Vainillina), y secuestrante de toxinas (Aluminosilicato sódico cálcico) de uso autorizado.

INDICACIONES DE USO

TERNEROS EN RODEOS LECHEROS. Desde el primer día que el ternero entra al sistema de crianza, ofrecer 4 litros de leche o CIVET SUSTILAC junto con CIVET STARTER EX EXTRUSADO a razón de 1/4 de medida por día (* IMPORTANTE: 1 medida= 400 gramos).

Incrementar gradualmente la cantidad hasta lograr el consumo de una medida por día entre los días 17 y 20. Desde ese momento suspender el aporte de leche y aumentar la oferta de CIVET STARTER EX EXTRUSADO a 2 medidas por día durante 10 días.

A partir del día 31 suministrar tres medidas por día de CIVET STARTER EX EXTRUSADO e incorporar 800 gramos por día de un alimento balanceado de 18% de PB y heno de muy buena calidad.

Desde el día 46 ofrecer 1.200 gramos por día de alimento balanceado y disminuir gradualmente la oferta de CIVET STARTER EX EXTRUSADO hasta el día 60, cuando el animal pasa a recría.

TERNEROS EN RODEO DE CARNE

Destetar los terneros con 30 días de vida o con 50 kg de peso vivo en corrales o piquetes con agua a discreción.

Constituir lotes de tamaño homogéneo.

Controlar que todos los animales ingieran el alimento.

Ofrecer 25 a 30 cm de comedero por animal.

Para favorecer el consumo es conveniente colocar el heno en el fondo del comedero y luego incorporar el alimento.

El día 35 termina la etapa de destete y los animales pasan a un sistema de invernada tradicional.

SUGERENCIAS

Suministrar siempre agua de buena calidad en forma permanente.

Si necesita información adicional, comuníquese con el distribuidor zonal.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

¡IMPORTANTE!

Conservar este producto en lugares secos, frescos y oscuros.

COMPOSICIÓN

Tenor mínimo de Proteína Bruta	22,0 %
Tenor máximo de Fibra Cruda	8,0 %
Tenor mínimo de Extracto Etéreo	5,0 %
Tenor promedio de E.L.N.	47,5 %
Tenor máximo de Minerales Totales	9,0 %
Tenor máximo de Humedad	12,5 %
Tenor de Calcio (mín-máx)	1,0 - 1,2 %
Tenor de Fósforo (mín-máx)	0,6 - 0,8 %
Energía Metabolizable mínima.	3.000 kcal/kg

F. ELAB.

F. VTO.

N° LOTE

USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 9.163/A/E

Producto Certificado SENASA N° 03-073/A

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L. Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 20 kg