

COMPOSICIÓN

Florfenicol 30,0 g

Excipiente c.s.p. 100,0 ml

INDICACIONES. Su uso está indicado en bovinos para el tratamiento de afecciones respiratorias y en general provocadas por gérmenes sensibles al florfenicol (*Pasteurella haemolítica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*).

POSOLOGÍA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. La dosis será de 1ml. cada 15 kg de peso (20 mg/ kg) debiéndose aplicar por vía intramuscular, preferentemente en la tabla del cuello. Se recomienda realizar dos aplicaciones separadas cada una por un intervalo de 48 hs.

PRECAUCIONES. No administrar más de 20 ml en cada punto de inyección.

EFFECTOS SECUNDARIOS. Puede provocar pérdida de apetito. En caso de sobredosis puede presentarse un ligero reblandecimiento de las heces. Ambos efectos son transitorios y desaparecen al suspender el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES. No administrar a toros adultos destinados a la reproducción. Aún cuando el florfenicol no es un teratógeno, reduce el peso fetal y retarda la osificación, por lo que no se recomienda su administración a hembras gestantes.



FLORFENICOL INYECTABLE

SOLUCIÓN ANTIBIÓTICA

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA

VENTA
BAJO RECETA



CONT. NETO
500 mL INDUSTRIA ARGENTINA

RESTRICCIONES DE USO. No administrar a vacas lecheras en producción. No aplicar el producto 28 días antes del sacrificio para consumo humano.

**CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL,
ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE



Laboratorio

**Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310
Producto Certificado SENASA Nº 01-324**

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.
Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar