

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina (como dihidrato)

Agentes de formulación c.s.p.

30,0 g

100,0 mL

INDICACIONES. Se utiliza en bovinos y porcinos para control y tratamiento de enfermedades respiratorias (neumonías y bronconeumonías), enteritis, infecciones urogenitales y procesos infecciosos en general de tejidos blandos, causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

Es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, efectivo contra bacterias gram positivas (*Actinomyces* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.) y gram negativas (*Actinobacillus* spp., *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Campylobacter* spp., *Escherichia coli*, *Fusobacterium necrophorus*, *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella bovis*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.). Además actúa contra *Chlamydia* spp., *Mycoplasma* spp., *Anaplasma* spp. y *Coxiella burnetti*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS. Administrar por vía intramuscular profunda.

- Dosis baja: 1 mL cada 15 kg de peso (20 mg/kg).

- Dosis alta: 1 mL cada 10 kg de peso (30 mg/kg).

La elección de la dosis dependerá de la severidad del caso clínico y del criterio del profesional actuante. En general es suficiente con una sola aplicación, ya que la dosis de 20 mg/kg mantiene su efectividad durante 3 a 4 días y la de 30 mg/kg por 5 a 6 días. Por lo tanto, de ser necesario se puede repetir el tratamiento entre los 3 y los 6 días.

No inyectar más de 20 mL por punto de aplicación en bovinos y no más de 10 mL por punto en porcinos.

RESTRICCIONES DE USO. En dosis bajas (20 mg/kg) no destinar al consumo humano los animales tratados hasta 28 días después de la última inyección. En dosis altas (30 mg/kg) no destinar al consumo humano los animales tratados hasta 35 días después de la última inyección. No administrar a vacas lecheras en producción.



OXITETRACICLINA 30 INYECTABLE

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA



VENTA BAJO RECETA

CONT. NETO
500 mL

INDUSTRIA ARGENTINA

F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE

PRECAUCIONES. Pueden presentarse reacciones individuales de alergia. Puede presentarse irritación en el sitio de aplicación. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Su uso en hembras gestantes puede inducir coloración anormal en las piezas dentarias del neonato.

CONSERVAR ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310
Producto Certificado SENASA N° 96.217
Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.
Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar