

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (como fosfato) 25,0 g
Agentes de formulación c.s.p. 100,0 mL

INDICACIONES. Está indicado para el tratamiento de afecciones respiratorias de pollos y pollitas de reposición. Es efectivo contra los siguientes microorganismos: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS. Administrar en el agua de bebida para proporcionar una dosis diaria de 15-20 mg/kg p.v. durante 3 días. Esta dosis se obtiene diluyendo 30 mL de CIVET TILMICOSINA 25 ORAL por cada 100 L de agua. Se recomienda colocar en el depósito la mitad de agua a usarse y luego incorporar la cantidad calculada del producto. Agitar e incorporar el volumen restante de agua. Preparar sólo el agua de bebida a consumir dentro de las 24 horas.

CONTRAINDICACIONES. No aplicar a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos. Utilizar únicamente por vía oral. No permitir el acceso al agua medicada a los equinos. No administrar a gallinas cuyos huevos se destinen a consumo humano.



TILMICOSINA 25 ORAL ANTIMICROBIANO PARA POLLOS y POLLITAS DE REPOSICIÓN

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA



VENTA BAJO RECETA

CONT. NETO
1.000 mL INDUSTRIA ARGENTINA

PERIODO DE RETIRO. 12 días.

PRECAUCIONES. Peligrosa su ingestión y/o contacto con piel y mucosas. Manipular con mucho cuidado evitando el contacto con la piel y mucosas mediante el uso de protección adecuada (guantes, gafas, etc).

CONSERVAR ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160

F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE



Laboratorio



Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310

Producto Certificado SENASA N° 09-098

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar