

COMPOSICIÓN

Sulfóxido de Albendazol (Ricobendazol)

15,0 g

Agente de formulación c.s.p.

100,0 mL


INDICACIONES. Para control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales que afectan al ganado bovino. Su espectro de acción abarca parásitos adultos, inmaduros y huevos.

Géneros susceptibles: *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertegia ostertagi*, *Cooperia oncophora*, *Nematodirus elvetianus*, *Bunostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum radiatum*.

A la misma dosis es igualmente efectivo contra L1 de *Dyctio-caulus viviparus* (parásitos pulmonares).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS. Subcutánea por delante o detrás de la paleta, a razón de 1 mL por cada 40 kg de peso (equivalente a 3,75 mg/kg de ricobendazol). Es recomendable no aplicar más de 10 mL por punto de inyección.

RESTRICCIONES DE USO. No destinar a consumo humano la carne de los animales tratados hasta 28 días después de la última aplicación. No aplicar durante los primeros 45 días de gestación. No aplicar a vacas lecheras en producción.



RICOBENDAZOL

INYECTABLE

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA

VENTA
BAJO RECETA



CONT. NETO
500 mL

INDUSTRIA ARGENTINA

RECOMENDACIONES. Agitar antes de usar.

**CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL,
ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**



F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310
Producto Certificado SENASA N° 99.271
Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.
Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar